

LES ANTIPSYCHOTIQUES À ACTION PROLONGÉE (AAP) : ÉLABORATION DE PROTOCOLES THÉRAPEUTIQUES MÉDICAMENTEUX INFIRMIERS (PTMI)

Nathan Chazarenc¹, Hugues de Bouët du Portal¹, Mary-Christine Lanoue¹, Clara Damade¹, Coralie Jarraud¹, Mathieu de Graaf², Pauline Fremaux³
1 : OMÉDIT Centre Val de Loire ; 2 : OMÉDIT Hauts-de-France ; 3 : OMÉDIT Pays de la Loire

INTRODUCTION

Notre commission régionale « psychiatrie et santé mentale » a identifié et travaillé sur plusieurs **situations à risque évitables spécifiques à la psychiatrie** : les « never-events »

OBJECTIFS

Réaliser des PTMI à destination des infirmier-es (IDE) pour les aider dans leur pratique et pour **standardiser, harmoniser et sécuriser les pratiques** dans notre région.

MATERIEL & METHODES

Les PTMI sont élaborés à partir de diverses sources : Résumés Caractéristiques Produits (RCP), fiches du réseau PIC (Psychiatrie Information Communication), **échanges pluridisciplinaires** avec les professionnels du **terrain**, documents des laboratoires pharmaceutiques. Ce travail a été mené en collaboration avec l'OMÉDIT Hauts-de-France.



RESULTATS

4 PTMI ont été élaborées et d'autres sont en cours de rédaction. Ils sont disponibles en accès libre sur notre site internet :


- Halopéridol décanoate
- Palipéridone à libération prolongée
- Olanzapine à libération prolongée
- Aripiprazole à libération prolongée

La **trame est commune** et a été validée avec la Haute Autorité de Santé. Elle comporte systématiquement les catégories suivantes : **identification du médicament, indications, préparation & modalités d'administration, oublis de prise & surveillance**

Ci-dessous : extraits de différents PTMI

Observatoire des
Médicaments
Dispositifs médicaux
Innovations Thérapeutiques



ARIPIPRAZOLE (ABILIFY MAINTENA®)
Poudre et solvant pour **suspension injectable à libération prolongée**
OU seringue pré-remplie 300 et 400 mg
Schizophrénie de l'adulte

Protocole Thérapeutique Médicamenteux Infirmier (PTMI)
Outil d'aide à l'administration à destination des IDE à la suite d'une prescription médicale

J1 150mg J8 100mg J36 400mg

Posologie d'entretien





Schéma d'administration

Choix de l'aiguille selon l'IMC


IMC	Aiguille pour prélever le volume de suspension ¹	Aiguille pour l'injection ²
< 30	50mm	38mm
> 30	38mm	50mm



Agiter vigoureusement la seringue de **manière verticale** au moins **20 secondes** jusqu'à obtention d'une suspension homogène **uniforme de couleur blanc cassé**.

Si l'injection n'est pas pratiquée immédiatement :
Conservation de la seringue :

- ✓ Température **inférieure à 25 °C, 2h max**
- ✓ Avant injection : agiter au moins **20 secondes**



Pour les retirer :
Tourner le capuchon du **dessus** et le capuchon de la **pointe**.

CONCLUSION

Ce travail a été **très bien accueilli** par les professionnels de la **région** qui ont apprécié nous faire des retours **et sont demandeurs** de nouveaux PTMI.