



### Situations à proscrire

- ✗ Écraser "par habitude"
- ✗ Écraser sans prescription
- ✗ Broyer plusieurs médicaments ensemble
- ✗ Écraser les formes galéniques LP, LM, gastro-résistantes, sublinguales
- ✗ Écraser les anticancéreux per os
- ✗ Mélanger les médicaments écrasés dans des jus de fruits, boissons acides ou boissons chaudes ou dans le contenu de l'assiette



### Conduite à tenir

- ✓ S'appuyer sur la **prescription médicale** précisant l'acte de broyer / écraser
- ✓ Vérifier les spécialités écrasables ou non à l'aide de la [liste nationale des spécialités écrasables](#)
- ✓ Réserver l'écrasement du médicament **aux cas sans alternatives**
- Lorsque le broyage du médicament est nécessaire, le réaliser
  - ✓ • avec un matériel adapté et propre
  - ✓ • avec un équipement de protection individuel (gant...)
- ✓ Broyer/ écraser **au plus près de l'administration** : 1 médicament à la fois / 1 patient à la fois
- ✓ S'assurer que le **véhicule d'administration soit compatible** avec la molécule ( privilégier eau et eau gélifiée)
- ✓ Administrer avec une petite quantité d'aliments / boisson pour garantir la prise complète du traitement



**L'acte de broyage relève de la responsabilité de l'IDE**